


ГОРМОНАЛЬНАЯ ФИТООНКОТЕРАПИЯ

Показания к консервативной терапии


- Различные варианты диффузных форм мастопатий
- Диффузно – узловая мастопатия
- Непролиферативные формы доброкачественных узловых дисплазий
- Сецернирующие молочные железы не связанные с внутрипротоковыми разрастаниями

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Взаимодействие между секрецией пролактина (ПРЛ), гонадотропного рилизинг-гормона (ГнРГ) и гонадотропинов (фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ))


В нормальных условиях



Гиперпролактинемия



Agnus castus






Мастодинон




Натуральный негормональный препарат для
лечения умеренных форм мастопатии,
мастодинии и ПМС

Мастодинон/Состав



Фиалка альпийская
(Цикламен)

Используется при лечении головных болей, нервных и психических расстройствах



Лилия тигровая
Tigerlilie

Применяется при болезненных менструациях и повышенной возбудимости




Витекс священный

Эффективен при болях в молочной железе



Ирис разноцветный

Используется для лечения мигрени



Стеблелист василистниковидный

Применяется при менструальных расстройствах




Грудошник горький

Эффективен при нервных расстройствах, психовегетативных кризовых состояниях

Экстракт *Vitex Agnus castus* BNO 1095 (мастодион)

Фармакология

- ❑ Допаминаргический эффект
- ❑ Нормализует повышенный уровень пролактина
- ❑ Включается в регулирующий круг гипоталамус-гипофиз-яичники
- ❑ Устраняет дисбаланс половых гормонов



Мастодинон

Показания для применения:

- Фиброзно – кистозная мастопатия
- Предменструальный синдром: мастодиния, психическая лабильность, запоры, отеки, головная боль/мигрень
- Нарушение менструального цикла и/или бесплодие вызванные недостаточностью желтого тела



Мастодинон

Дозировка и способ применения

- 1 таблетка 2 раза в день (утром и вечером) с небольшим количеством жидкости
- 30 капель 2 раза в день (утром и вечером) с небольшим количеством жидкости


Курс лечения не менее 3 месяцев, без перерыва во время менструации.

Если после прекращения приема жалобы возобновляются, то терапию следует продолжить после консультации с лечащим врачом.

Мастодинон

Двойные-слепые, плацебо-контролируемые
испытания при мастодинии

Снижение эффективности
масталгии:




Красный = Плацебо,
Зеленый = Мастодинон®;

(Стандарт исследований GCP)

Отчетливое улучшение в виде снижения интенсивности мастодинии по ВАШ (Визуальная аналоговая шкала) отмечалось более чем у 70 % пациенток, принимавших Мастодинон в течение 3 месяцев.

Клиническая эффективность препарата Мастодион в лечении галактореи, не связанной с органической внутрипротоковой патологией



- Уменьшение объема выделений
- Полное прекращение выделений
- Отсутствие эффекта

Количество пациентов - 316

Длительность лечения –
2 курса по 3 месяца с
интервалом в 1,5-2месяца.

Мастодинон

Предменструальный синдром


	Средние величины степени расстройств			
	До лечения	После 1 месяца лечения	После 2 месяцев лечения	После 3 месяцев лечения
Общие соматические расстройства	15,66	11,32	8,14	5,70
Боли в молочных железах	5,05	3,43	2,23	1,31
Боли внизу живота	2,43	1,94	1,44	1,10
Невралгии	2,68	2,06	1,63	1,24
Раздражительность	2,86	2,06	1,54	1,18
Депрессии	1,85	1,36	0,98	0,77
Головные боли	1,98	1,48	1,10	0,80
Общие отеки	0,79	0,62	0,43	0,30
Отеки лодыжек	0,84	0,66	0,48	0,34
Отек бедра	0,79	0,61	0,43	0,28
Чувство переполнения	2,02	1,52	1,15	0,83
Запор	1,72	1,37	1,15	0,87
Вздутие живота	1,37	1,01	0,77	0,61

**Улучшение
состояния при ПМС
благодаря терапии
Мастодиномом.
Контрольные
исследования до
лечения, после 1, 2, и
3 месяцев лечения.**

Циклодинон

Состав

Прутняк
Монаший перец
Витекс Священный
Авраамово дерево



Циклодинон

Фитотерапевтический
высокотехнологичный
монокомпонентный продукт
для лечения нарушений
менструального цикла,
предменструального синдрома



Снижает повышенный
уровень пролактина
посредством
допаминергического
механизма действия



Циклодинон

Режим дозирования

- по 1 таблетке или 40 капель один раз в день
- Принимать более месяца без перерыва
- Даже после затихания или улучшения расстройств лечение следует продолжить ещё на несколько недель.

Hypericum perforatum L. (Гелариум) Зверобой продырявленный



Многолетнее травянистое растение высотой до 80 – 100 см. Семейство зверобойные (Hypericaceae). Широко распространен.

Основные действующие вещества: Гиперицин, псевдогиперицин, гиперфорин, флавоноиды

Применение в медицине:

Различные лекарственные формы применяют при дискинезии желчных путей, гепатитах, холециститах, гастритах, метеоризме, для улучшения функции почек, при нарушениях периферического кровообращения, как антисептическое средство при заболеваниях десен, наружно – при язвах, фурункулах, ожогах и др.

Показания к применению:

- психовегетативные расстройства
- невротические реакции (состояния выражающиеся повышенной тревожностью, напряжением и беспокойством)
- депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести



Состав: сухой экстракт травы зверобоя (1 драже содержит сухого экстракта BNO 1385 травы зверобоя продырявленного 285 мг), что соответствует 0,9 мг суммы гиперацинов в пересчете на гиперацин

КЛИМАДИНОН

- Фитопрепарат- используется при лечении климактерических невроvegetативных и психических расстройств, симптомами которых служат: приливы, приступы потливости, пульсация, тахикардия, расстройства сна, перемены настроения, раздражительность и т.д.
- Рекомендуемая доза: по 1 таблетке 2 раза в день в течении 6 месяцев




ФЕМИГЛАНДИН GLA+E

- Источник полиненасыщенных жирных кислот с витамином E.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- дисфункция яичников;
- дисменорея;
- мастопатия, масталгия;
- эндометриоз;
- предменструальный синдром (депрессия, головные боли, перепады настроения, скачки артериального давления).





ФЕМИВЕЛЛ

Нутрицевтик, в состав которого входят фитоэстрогены сои и красного клевера, соевый белок и витамин Е.

Форма выпуска: 60 таблеток

Рекомендуемая дозировка: по 1 таблетке в день

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- способствует нормализации гормонального статуса у женщин
- облегчает симптомы наступления менопаузы
- улучшает липидный состав крови
- предупреждает развитие остеопороза
- способствует профилактике рака молочной железы и эндометрия

ИНДИНОЛ



- Регулятор патологических пролиферативных процессов заболеваний репродуктивной системы человека.
- Содержит высокоочищенный индол – 3 – карбинол.

Форма выпуска: капсулы по 300мг.

Рекомендуемая дозировка: по 2 – 4 капсулы ежедневно в течении 1 – 3 месяцев.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- **МАСТОПАТИЯ**

- Фиброаденоматоз

- Фиброзно – кистозная мастопатия

 - с пролиферацией;

 - с пролиферацией и атипией;

 - без пролиферации и атипии;

- **ЭНДОМЕТРИОЗ**

- **МИОМА**

- **ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ**

ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ

- Натуральный прогестерон идентичный прогестерону который вырабатывается в организме женщины
- Не влияет на общий гормональный фон организма



Эффективен при лечении:

- Диффузной фиброзной мастопатии вызванной недостаточностью прогестерона
- Боли в молочных железах связанные
 - с приемом пероральных контрацептивов;
 - беременностью;
 - гормональной перестройкой в организме девочек – подростков;
 - предменструальным синдромом;
 - мастопатией.



ПАРЛОДЕЛ (БРОМКРИПТИН)

Стимулятор дофаминовых рецепторов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Пролактинозависимые нарушения менструального цикла
- Женское бесплодие
- Предменструальный синдром
- Пролактиномы
- Подавление лактации
- Доброкачественные заболевания молочных желез



ДОСТИНЕКС (КАБЕРГОЛИН)

Препарат для лечение заболеваний, обусловленных или сочетающихся с гиперпролактинемией: аменорея, галакторея, бесплодие, пролактин-секретирующая аденома гипофиза, акромегалия. Применяется для подавления лактации.

Состав и форма выпуска:

Достинекс таблетки: в упаковке 2 и 8 шт.

1 таблетка Достинекс содержит каберголин 500 мкг.

ДИКЛОФЕНАК

Состав:

1 г геля содержит 50 мг диклофенака натрия.

Фармакологическое действие:

Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС). Оказывает противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действие, обусловленное угнетением синтеза простагландинов.

Показания к применению:

Состояния воспалительного характера, сопровождающиеся болью и отеком.



МАКСИ - БАЙКАЛ

Нурицевтик, содержащий комплекс витаминов и микроэлементов из натурального сырья.

Рекомендуемая дозировка:

по 1 таблетке в день

Форма выпуска:

упаковка 30, 60, 90 таблеток



Спасибо за внимание!